2ème congrès de la Société Ivoirienne de Médecine du Travail
Grand Bassam : 25 – 27 Octobre 2017

EPIDEMIOLOGIE DES MALADIES CHRONIQUES EN MILIEU PROFESSIONNEL AU TOGO

Bana-ewai E, Wasungu BD, Dadjo S, Amevor KM.

INTRODUCTION (1)

- **Les maladies chroniques (MC) et les facteurs de risque qui leur sont associés = fardeau majeur pour les populations à travers le monde.**
- **Responsables d'une part majeure et sans cesse croissante de la mortalité et de la morbidité dans toutes les régions du monde.**
- **Première cause de mortalité dans le monde (63% des décès)**

INTRODUCTION (2)

- **Les MC (MCV, cancers, affections respiratoires chroniques, diabète) = nouveau défi dans la lutte pour l'amélioration de la santé mondiale. Elles sont considérées aujourd'hui non seulement comme un problème de santé publique mais aussi comme un problème économique et politique.**
- **Pathologies invalidantes /Handicap et départ anticipé du monde du travail. Peu de données sur prévalence des MC et leurs FdR en milieu de travail au Togo. Enquête STEPS en 2010 (pop. Générale / 4800 personnes de 15-64 ans).**

Objectif: Décrire le profil des maladies chroniques en milieu de travail au Togo.

MATERIELS ET METHODE

- **Etude descriptive transversale / 742 dossiers médicaux de travailleurs reçus au SSST dans le cadre de la VMP.**
- **Période: Mars-novembre 2016.**
- **Cadre: entreprise de l'économie numérique au Togo.**
- **Analyse des données: Le Sphinx V5 Plus.**

RESULTATS ET DISCUSSION (1)
Caractérisques générales de la population d'étude

- **Age**

Age moyen = 45,97 ans

Extrêmes [20-60 ans]



RESULTATS ET DISCUSSION (2)

Caractéristiques générales de la population d'étude

- **Sexe** (n= 742)



- **Prédominance masculine (sex-ratio: 3,7).**

RESULTATS ET DISCUSSION (3)
Maladies chroniques

Prévalence = 73,59%



RESULTATS ET DISCUSSION (4)
Maladies chroniques

- **Prédominance masculine: 69,36%**
- **[50 – 60ans] ++++ (72,61%)**
- **Aouatef M. (Tunisie) : Diabète (14,6%), maladies cardiovasculaires (13,8%), troubles de la réfraction (10,8%) et pathologies pleuropulmonaires (8,5%) chez les agents municipaux.**

RESULTATS ET DISCUSSION (5)

Facteurs de risque

Facteurs de risque	Notre étude	Enquête STEPS
Consommation d'alcool	60,05%	53,7%
Surpoids et obésité	52,02%	40,7%
Inactivité physique	34,91%	31,7%
Hypercholestérolémie	29,38%	25,6%
Consommation de tabac	2,56%	8,5%

RESULTATS ET DISCUSSION (6)
Aptitude médicale au poste de travail

- Deux (02) : changements de poste de travail.
- Six (06) : pensions d’invalidité.
- Quatre (04): retraite anticipée.

CONCLUSION

- **Notre étude a permis de confirmer l'importance des MC dans le monde du travail au Togo où elles altèrent la qualité de vie des patients et ont un impact négatif sur la productivité des entreprises. Leurs principaux facteurs de risque pourraient être limités par la mise en place de programmes de prévention au sein de nos entreprises.**

MERCI POUR VOTRE ATTENTION